

## OKFH 2 III kolokvijum

### Literatura:

1. U. Mioč, R. Hercigonja, **Zbirka zadataka iz opšteg kursa fizičke hemije**, Beograd 1997, str 97-109, 211-257
2. M. Ristić, I. Pašti, I. Cekić-Lasković, **Praktikum iz opšteg kursa fizičke hemije**, Beograd 2010, poglavlja 8, 9 i 10.
3. I. Holclajtner-Antunović, **Opšti kurs fizičke hemije**, Beograd 2012, str 249-254, 261-269, 446-465, 469-474, 476-479, 487-499, 502-504.

### Zadaci:

**III 1.** Na površini vode 0.0001 g stearinske kiseline ( $C_{17}H_{35}COOH$ ) obrazuje monomolekulski sloj površine  $470 \text{ cm}^2$ . Gustina stearinske kiseline je  $0.85 \text{ g/cm}^3$ , a molska masa 284 g/mol. Izračunati površinu koju zauzima jedan molekul stearinske kiseline,  $S_{\text{molekul}}$ , i debljinu adsorbovanog sloja,  $d$ .

#### Rešenje:

$$\begin{aligned} m(C_{17}H_{35}COOH) &= 0.0001 \text{ g} \\ \rho(C_{17}H_{35}COOH) &= 0.85 \text{ g/cm}^3 \\ M(C_{17}H_{35}COOH) &= 284 \text{ g/mol} \\ S = 470 \text{ cm}^2 \\ \hline S_{\text{molekul}} &=? \\ d &=? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{0.0001 \text{ g}}{284 \text{ g/mol}} = 3.5 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \\ \Gamma &= \frac{n}{S} = \frac{3.5 \cdot 10^{-7} \text{ mol}}{470 \text{ cm}^2} = 7.5 \cdot 10^{-10} \text{ mol/cm}^2 \\ \Gamma N_A &= 7.4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/cm}^2 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 4.49 \cdot 10^{14} \text{ molekula/cm}^2 \\ S_{\text{molekul}} &= \frac{1}{\Gamma N_A} = 2.2 \cdot 10^{-15} \text{ cm}^2 \\ d &= \frac{\Gamma M}{\rho} = \frac{7.4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/cm}^2 \cdot 284 \text{ g/mol}}{0.85 \text{ g/cm}^3} = 2.47 \cdot 10^{-7} \text{ cm} \end{aligned}$$

**III 2.** Odrediti količinu adsorbovanog acetona ( $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ ) u graničnoj površini ( $\text{mol/m}^2$ ) na temperaturi  $15^\circ\text{C}$  za rastvor koji sadrži 29.0 g acetona u  $1 \text{ dm}^3$ . Površinski napon rastvora acetona na datoј temperaturi je  $59.4 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$ , a površinski napon vode na istoj temperaturi je  $73.35 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$ .

**Rešenje:**

$$c = 29.0 \text{ g} / \text{dm}^3$$

$$\gamma_r = 59.4 \cdot 10^{-3} \text{ N} / \text{m}$$

$$\gamma_{H_2O} = 73.35 \cdot 10^{-3} \text{ N} / \text{m}$$

$$\Gamma = ?$$

$$M(CH_3COCH_3) = 58 \text{ g} / \text{mol}$$

$$c_M = \frac{c}{M} = \frac{29.0 \text{ g} / \text{dm}^3}{58 \text{ g} / \text{mol}} = 0.5 \text{ mol} / \text{dm}^3$$

$$\Gamma = -\frac{c_M}{RT} \frac{d\gamma}{dc}$$

$$\frac{d\gamma}{dc} \approx \frac{\Delta\gamma}{\Delta c} = \frac{\gamma_r - \gamma_{H_2O}}{c_M} = -27.9 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{dm}^3 / \text{m} \cdot \text{mol}$$

$$\Gamma = -\frac{0.5 \text{ mol} / \text{dm}^3}{8.314 \text{ J} / \text{mol} \cdot \text{K} \cdot 288 \text{ K}} (-27.9 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{dm}^3 / \text{m} \cdot \text{mol})$$

$$\Gamma = 5.83 \cdot 10^{-6} \text{ mol} / \text{m}^2$$

**III 3.** Ispitivana je adsorpcija acetona na aktivnom uglju na 20 °C i dobijeni su sledeći podaci:

$c (\text{mmoldm}^{-3})$	2.34	14.65
$x/m (\text{mmolg}^{-1})$	0.208	0.618

Odrediti konstante  $k$  i  $n$  u Frojndlihovoj izotermi.

**Rešenje:**

Logaritmovanjem osnovnog oblika Frojndlihove izoterme ( $\frac{x}{m} = kc^n$ ) dobija se

sledeća jednačina:  $\ln \frac{x}{m} = \ln k + \frac{1}{n} \ln c$ , odakle se vidi da je zavisnost  $\ln \frac{x}{m}$  od  $\ln c$  linearna. Konstante  $k$  i  $n$  mogu se odrediti rešavanjem ove jednačine za dve date vrednosti  $c$  i  $x/m$ :

$$\ln 0.208 = \ln k + \frac{1}{n} \ln 2.34$$

$$\ln 0.618 = \ln k + \frac{1}{n} \ln 14.65$$

Oduzimanjem se dobija:  $\ln 0.208 - \ln 0.618 = \frac{1}{n} (\ln 2.34 - \ln 14.65)$  odakle je:

$\frac{1}{n} = 0.59$ , to jest  $n = 1.68$ . Vraćanjem ove vrednosti u neku od gornjih jednačina

dobija se  $k = 0.145 \text{ mmol g}^{-1}$ .

**III 4.** Gvozdena kuglica gustine  $7.9 \text{ g/cm}^3$  i dijametra  $4 \text{ mm}$  pada sa visine od  $1 \text{ m}$  kroz ulje gustine  $1.1 \text{ g/cm}^3$  za  $55 \text{ s}$ . Izračunati viskoznost ulja.

**Rešenje:**

$$\rho_k = 7,9 \text{ g/cm}^3 = 7900 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_u = 1,1 \text{ g/cm}^3 = 1100 \text{ kg/m}^3$$

$$r = d/2 = 2 \text{ mm}$$

$$v = l/t = 1 \text{ m}/55 \text{ s} = 0.0182 \text{ m/s}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

$$t = 55 \text{ s}$$

$$\eta = ?$$

$$\frac{4}{3} r^3 \pi \rho_k g = \frac{4}{3} r^3 \pi \rho_u g + 6 \pi \eta r v$$

$$6 \cdot 3,14 \cdot 0,002 \text{ m} \cdot 0,0182 \text{ m/s} \cdot \eta = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (0,002 \text{ m})^3 (7900 - 1100) \text{ kg/m}^3$$

$$\eta = 3,25 \text{ Pas}$$

**III 5.** Izračunati koeficijent viskoznosti alkoholnog rastvora na  $27^\circ\text{C}$ , koji kroz kapilaru viskozimetra po Ostvaldu istekne za  $398 \text{ s}$ , dok ista zapremina vode kroz istu kapilaru istekne za  $105 \text{ s}$ . Gustina rastvora je  $809 \text{ kg/m}^3$ , a vode  $997.4 \text{ kg/m}^3$ . Koeficijent viskoznosti vode iznosi  $9.57 \cdot 10^{-4} \text{ Pas}$ .

**Rešenje:**

$$\rho_r = 809 \text{ kg/m}^3$$

$$t_r = 398 \text{ s}$$

$$\rho_{H_2O} = 997.5 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{H_2O} = 105 \text{ s}$$

$$\eta_{H_2O} = 9.57 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\eta_r = ?$$

$$\eta_r = \frac{\rho_r t_r}{\rho_{H_2O} t_{H_2O}} \eta_{H_2O} = \frac{809 \text{ kg/m}^3 \cdot 398 \text{ s}}{997.5 \text{ kg/m}^3 \cdot 105 \text{ s}} \cdot 9.57 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\eta_r = 2.942 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

**III 6.** Odrediti koeficijent viskoznosti gasa na  $23^\circ\text{C}$  ako iz kapilare dužine  $100 \text{ cm}$  i dijametra  $1 \text{ mm}$  za  $100 \text{ s}$  istekne  $920 \text{ cm}^3$  gasa. Pritisak na krajevima kapilare iznosi  $101974.5 \text{ Pa}$  i  $101308 \text{ Pa}$ .

**Rešenje:**

$$l = 100\text{cm} = 0.1\text{m}$$

$$r = 1\text{mm} = 0.001\text{m}$$

$$t = 100\text{s}$$

$$V = 902\text{cm}^3 = 902 \cdot 10^{-6}\text{m}^3$$

$$p_1 = 101974.5\text{Pa}$$

$$p_2 = 101308\text{Pa}$$

---


$$\eta = ?$$

$$\eta = \frac{\pi(p_1 - p_2)r^4 t}{8lV} = \frac{3.14(101974.5 - 101308)\text{Pa}(0.001\text{m})^3 100\text{s}}{8 \cdot 0.1 \cdot 902 \cdot 10^{-6}\text{m}^3}$$

$$\eta = 2.89 \cdot 10^{-4}\text{ Pa} \cdot \text{s}$$

**III 7.** Napisati formulu miclele sola dobijenog mešanjem  $15\text{ cm}^3$   $0.025\text{M}$  rastvora  $\text{KCl}$  i  $85\text{ cm}^3$   $0.005\text{M}$  rastvora  $\text{AgNO}_3$ .

**Rešenje:**



$$n_{\text{AgNO}_3} = c_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} = 15 \cdot 10^{-3}\text{dm}^3 \cdot 0.025\text{mol/dm}^3 = 3.75 \cdot 10^{-4}\text{mol}$$


$$n_{\text{KCl}} = c_{\text{KCl}} \cdot V_{\text{KCl}} = 15 \cdot 10^{-3}\text{dm}^3 \cdot 0.005\text{mol/dm}^3 = 7.5 \cdot 10^{-5}\text{mol}$$

$$n_{\text{AgNO}_3} > n_{\text{KCl}}$$

$$\left[ (\text{AgCl})_m n\text{Ag}^+ (n-p) \text{NO}_3^- \right]^{p(+)} p\text{NO}_3^-$$

**III 8.** Koju zapreminu  $0.001\text{ M}$  rastvora  $\text{AgNO}_3$  treba dodati u  $1\text{cm}^3$   $0.029\%$  rastvora  $\text{NaCl}$  da bi nagrađene koloidne čestice imale pozitivno nanelektrisanu granulu? Uzeti da je gustina rastvora  $\text{NaCl}$  jednaka  $1.01\text{gcm}^{-3}$ .

**Rešenje:**



$$V = 1\text{cm}^3$$

$$w = 0.029\%$$

$$m = \rho V = 1\text{cm}^3 \cdot 1.01\text{g/cm}^3 = 1.01\text{g}$$

$$M(\text{NaCl}) = 58.45\text{g/mol}$$

$$0.029\text{gNaCl} : 100\text{g} = x : 1.01\text{g}$$

$$x = 2.929 \cdot 10^{-4}\text{g NaCl}$$

$$n = \frac{2.929 \cdot 10^{-4} \text{ g}}{58.45 \text{ g/mol}} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol NaCl}$$

$$V_{AgNO_3} = \frac{n}{c} = \frac{5 \cdot 10^{-6} \text{ mol}}{0.001 \text{ mol/dm}^3} = 0.005 \text{ dm}^3$$

Granula će biti pozitivno nanelektrisana ako je  $AgNO_3$  u višku, dakle  $V_{AgNO_3} > 5 \text{ cm}^3$